

ЭЛИТЖЕНЬ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название препарата: Элитжень.

МНН: Поликрезулен.

Лекарственная форма: Суппозитории вагинальные.

Состав: *Каждый суппозиторий содержит:*

Активное вещество: поликрезулена или полиметилена-мета-крезолсульфоновой кислоты - 90 мг;

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 6000, полиэтиленгликоль 400, вода очищенная

Описание: суппозитории от белого до светло-красно-коричневого цвета, торпедообразной формы.

Код АТХ: G01AX03.

Фармако-терапевтическая группа: Средство, преимущественно применяемое в акушерстве и гинекологии.

Фармакологические свойства:

Препарат обладает антибактериальным, трихомонацидным, противогрибковым и кровоостанавливающим эффектом, ускоряет эпителизацию ткани.

Фармакодинамика:

Суппозитории Элитжень во влагалище образуют кислую среду. Механизм действия связан с денатурацией и коагуляцией белка бактериальной клетки. Обладает избирательными коагуляционными свойствами и способствует отшелушиванию клеток некротических тканей. При отторжении нездоровых клеток, здоровый эпителиальный слой слизистой не повреждается, что усиливает эпителизацию. Также рН фактор придает вяжущее и сосудосуживающее действие, последнее приводит к кровоостанавливающему эффекту.

Суппозитории Элитжень активно воздействуют на: грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибки, анаэробные бактерии, трихомонады и монилазы и некоторые вирусы. Препарат нормализует бактериальную флору влагалища. На молочнокислые бактерии препарат не оказывает действия.

Показания к применению: Применяется местно при:

- эрозиях шейки матки и влагалища;
- воспалительных заболеваниях влагалища и шейки матки;
- цервицитах (усиление влагалищных выделений) при различных влагалищных инфекциях;
- генитальном зуде;
- язвах половых органов, возникших в результате использования pessaries;
- для нормализации влагалищной микрофлоры.

Применение Элитжень не приводит к возникновению рубцов.

Лечение проводится под врачебным наблюдением после исключения опухолевого и других специфических процессов.

Информация о проведении клинических испытаний препарата на пожилых людях отсутствует.

Способ применения и дозы:

Вагинальные суппозитории Элитжень применяют один раз в два дня. После каутеризации применять суппозитории с интервалом один раз в два дня. Суппозитории желательно применять в положении лежа, непосредственно перед сном. Для защиты нижнего белья использовать гигиенические прокладки. Перед применением суппозитории могут быть увлажнены водой.

Побочные действия:

Препарат редко вызывает аллергические реакции (раздражение, жжение и боли), которые исчезают после отмены препарата.

Противопоказания:

Не назначается для лечения эрозии шейки матки в период беременности.

Противопоказано применение препарата в период лактации.

Не применять детям.

Лекарственное взаимодействие:

При применении двух или более препаратов, проконсультироваться с врачом по вопросу совместимости препаратов. Не применять одновременно с препаратами, имеющими щелочную реакцию, так как происходит экзотермическая реакция, усиливающая химический ожог слизистых оболочек.

Особые указания:

- препарат только для наружного применения, не применять внутрь;
- препарат обладает усиленным ранозаживляющим эффектом и поэтому при лечении обильное отторжение некротизированных тканей является нормальным состоянием организма;

- препарат при местном применении не вызывает токсичного, тератогенного, мутагенного действия, до настоящего времени не наблюдалось резистентности к препарату;
- избегать попадания препарата в глаза;
- на время лечения следует отказаться от половой жизни;
- не использовать в гигиенических целях мыло, вызывающее раздражение;
- отменить препарат в период менструации.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами:

Не выявлены.

Передозировка:

Не выявлена.

Форма выпуска

По 6 суппозитория в ячейках из поливинилхлорида (ПВХ).

Суппозитории вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте и не применять после истечения срока годности.

Срок годности: 3 года.

Условия отпуска из аптек:

По рецепту.

Произведено для:

MAXX-PHARM LTD.

Лондон, Великобритания